

Nouvelles de mars 2024 - Paxlovid^{MC}

Veuillez consulter ci-dessous les nouvelles importantes concernant :

- Les dates d'expiration de Paxlovid^{MC} et l'ajustement des emballages pour les ordonnances (pp. 1-2).
- Rappel : interaction médicamenteuse avec Paxlovid^{MC} et le tacrolimus (pp. 2-3).

Dates de péremption du Paxlovid^{MC}

La plupart des approvisionnements existants de Paxlovid^{MC} financés par les fonds publics expireront au plus tard le 31 mars 2024, et les lots restants (y compris les paquets de doses pour l'insuffisance rénale) expireront le 31 mai 2024. Afin de prolonger la disponibilité des stocks financés par des fonds publics, les pharmaciens sont encouragés à utiliser d'abord le Paxlovid^{MC} dont la date d'expiration est la plus proche, qu'il s'agisse de la dose complète ou de la dose pour insuffisance rénale en ajustant les comprimés, les instructions et les conseils, selon les besoins.

Les numéros de lots dont la date d'expiration est prolongée jusqu'au 31 mai 2024 ([lien](#)) comprennent GR2928 (paquets de doses standard), GP9562 et GP9563 (paquets de doses pour insuffisance rénale). Pour les stocks qui expirent au plus tard le 31 mars 2024 ([lien](#)), distribuer le Paxlovid^{MC} uniquement jusqu'au 26 mars 2024 pour s'assurer que le produit n'expire pas au cours d'un traitement de cinq jours. Jusqu'au 26 mai 2024, utilisez uniquement les stocks limités qui expirent à la fin du mois de mai 2024.

Les pharmacies participantes doivent faire tous les efforts nécessaires pour obtenir et garantir l'accès au Paxlovid^{MC} financé par les fonds publics (en l'ajustant selon les instructions ci-dessous, le cas échéant) pour les patients admissibles (voir les critères d'admissibilité dans [l'avis d'EO](#) daté de décembre 2023).

À cette fin, les pharmacies sont autorisées à commander des paquets de doses pour insuffisance rénale supplémentaires provenant des stocks financés par les fonds publics auprès de leur distributeur attitré (McKesson ou Shoppers Drug Mart) selon les besoins.

Ajustement des emballages de Paxlovid^{MC} pour les ordonnances

Lors de l'utilisation de paquets de doses pour insuffisance rénale (DIN : 02527804) pour les patients nécessitant une dose complète (standard) :

- Utilisez le code PIN 09858154 (dose standard) pour la facturation (une demande de remboursement par ordonnance de Paxlovid^{MC} délivrée et financée par les fonds publics).
- Veillez à documenter tout ajustement de dose effectué.
- Les pharmaciens doivent faire preuve de jugement professionnel pour ajuster les paquets (méthode suggérée adaptée de la Colombie-Britannique) :
 - Combinez 2 paquets de doses pour l'insuffisance rénale. Dans un paquet, retirez et jetez 1 ritonavir 100 mg (comprimé blanc) de la dose du matin et de la dose du soir de chaque carte quotidienne.

Lors de l'utilisation de paquets de doses complètes (DIN : 02524031) pour les patients nécessitant un ajustement de la dose en cas d'insuffisance rénale :

- Utilisez le code PIN 09858162 (dose pour insuffisance rénale) pour la facturation (une demande de remboursement par ordonnance de Paxlovid^{MC} délivrée et financée par les fonds publics).
- Veillez à documenter tout ajustement de dose effectué.
- Les pharmaciens doivent faire preuve de jugement professionnel pour ajuster les paquets (méthode suggérée adaptée de la Colombie-Britannique) :
 - Retirez et jetez 1 nirmatrelvir 150 mg (comprimé rose) de la dose du matin et de la dose du soir de chaque carte quotidienne du paquet de doses complètes.

Les professionnels en pharmacie doivent faire preuve de jugement clinique lorsqu'ils délivrent le médicament afin de réduire les erreurs de dosage et la confusion des patients.

Remarque : Le contenu de cette communication vise à clarifier la façon dont les pharmacies peuvent soumettre des demandes de remboursement pour le Paxlovid^{MC} financé les fonds publics lorsque les paquets sont ajustés. Les méthodes d'ajustement des paquets sont fournies à titre informatif seulement et ne constituent pas des conseils ou des directives cliniques ou juridiques. Les pharmaciens qui ont des questions sur leurs obligations professionnelles ou sur l'exercice de la pharmacie peuvent contacter l'Ordre des pharmaciens de l'Ontario.

Élimination du Paxlovid^{MC}

Les pharmacies doivent éliminer les produits expirés financés par des fonds publics comme elles le feraient normalement pour les stocks expirés ou inutilisables de leur pharmacie. Ne renvoyez pas le produit expiré au distributeur ou au fabricant.

Interaction médicamenteuse entre le Paxlovid^{MC} et le tacrolimus

Comme l'indique [l'InfoVigilance sur les produits de santé](#) de mars 2023 de Santé Canada, des cas canadiens d'effets indésirables graves à la suite d'une interaction médicamenteuse entre le Paxlovid^{MC} et le tacrolimus ont été signalés à Santé Canada. Dans certains cas, on a observé que les taux de tacrolimus augmentaient rapidement et atteignaient des niveaux très élevés. Des taux élevés de tacrolimus peuvent entraîner des effets indésirables tels que des lésions rénales aiguës et une sensibilité accrue aux infections graves.

Santé Canada émet les avis suivants concernant les interactions médicamenteuses entre le Paxlovid^{MC} et les immunosuppresseurs (y compris la ciclosporine, l'évérolimus, le sirolimus et le tacrolimus) :

- Éviter l'utilisation de Paxlovid chez les patients prenant des immunosuppresseurs lorsqu'une surveillance étroite des concentrations d'immunosuppresseurs n'est pas possible.
- En cas d'administration concomitante, il est recommandé d'ajuster la dose de l'immunosuppresseur et de surveiller les concentrations de l'immunosuppresseur et les effets indésirables associés à l'immunosuppresseur.
- Se référer à l'étiquette du Paxlovid et à l'étiquette sur le contenant de chaque immunosuppresseur pour plus d'informations et demander l'avis du spécialiste du traitement immunosuppresseur du patient.
- Tenir compte du risque d'interactions médicamenteuses avant et pendant le traitement au Paxlovid; revoir les médicaments concomitants pendant le traitement au Paxlovid et surveiller les effets indésirables associés aux médicaments concomitants.

L'Ontario continue de fournir un accès au Remdesivir (Veklury^{MC}) pour le traitement de la COVID-19 chez les patients à risque élevé qui ne peuvent pas prendre le Paxlovid^{MC}. Le Remdesivir est disponible auprès de [Services de soutien à domicile et en milieu communautaire](#) et de certaines pharmacies, sur ordonnance d'un médecin ou d'une infirmière praticienne.

Renseignements supplémentaires :

Pour la facturation en pharmacie : Veuillez contacter le Service d'assistance du Programme de médicaments de l'Ontario au : 1 800 668-6641

Pour les préoccupations ou les questions liées à la COVID-19 en pharmacie : Veuillez envoyer un courriel au ministère à l'adresse : OPDPInfoBox@ontario.ca