


Réagir à une surdose d'opioïdes en cinq étapes

SYMPTÔMES DE SURDOSE D'OPIOÏDES

- Impossible de réveiller la personne
- Respiration lente ou en suspens
- Ronflements ou gargouillis
- Lèvres et ongles qui deviennent bleus, gris ou violets
- Pupilles contractées ou yeux tournés vers le haut
- Corps flasque ou muscles raidis

ÉTAPE

1



Crier et la secouer

le nom de la personne

par les épaules

ÉTAPE

2




Si la personne ne réagit pas,

appeler le 9-1-1 ou les urgences.

ÉTAPE

3




Administer de la naloxone

Administer de la naloxone : Vaporiser une fois dans une narine ou injecter un flacon, une ampoule, ou une seringue préremplie dans le bras ou la jambe.

ÉTAPE


4



Faire de la respiration de sauvetage et/ou des compressions thoraciques.

ÉTAPE

5



Est-ce que ça fonctionne?

Si **n'y a pas** d'amélioration dans les 2-3 minutes, recommencer les étapes 3 et 4. **Rester avec la personne.**

Position latérale de sécurité

Si la personne respire toute seule ou si vous devez la laisser seule, placez-la dans la position latérale de sécurité.

Les symptômes de surdose peuvent réapparaître lorsque les effets de la naloxone se dissipent au bout de 30 à 90 minutes. Si vous ne pouvez pas rester auprès de la personne, appelez le 9-1-1 ou les urgences.

